

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ กวก. จันทบุรี 5



ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2564

ประวัติ

จากการศึกษาและผสมข้ามพันธุ์ทุเรียนเพื่อผลิตทุเรียนลูกผสมในอนาคต ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528-กันยายน พ.ศ. 2533 ได้ทำการผสมข้ามพันธุ์โดยการใช้พันธุ์พันธุ์แม่ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 18 พันธุ์ (ตารางภาคผนวกที่ 1) เพื่อให้ได้ทุเรียนลูกผสมที่มีคุณภาพดี และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดและขยายช่วงการผลิต เช่น เป็นพันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงหนาถูก กลางถูก หรือปลายถูก (early, moderate or late maturity) ซึ่งมีคุณภาพดี โดยใช้ ชนิดน้ำ หมายเหตุ หมอนทอง กระดุมทอง อินัง ทองยอนฉัตร และชมพูศรี เป็นแม่พันธุ์สมด้วยพ่อพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ชนิดน้ำ หมายเหตุ หมอนทอง หมอนทอง กระดุมทอง กบพิกุลทอง กบสุวรรณ กบตาข่าย พวงมนี อีสีบ กระดุมทอง นาหิบ กะเตย ชมพูศรี ยำมะหวัด ฝอยทอง กบหนาศาลา และแบบเผา ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และสวนเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี โดยได้ทำการผสมข้ามพันธุ์ทุเรียนแบบสลับพ่อแม่จำนวน 55 คู่ผสม ได้เม็ดลูกผสมทั้งหมด 17,840 เม็ด นำไปเพาะได้ต้นกลากลูกผสม 7,634 ต้น หลังจากนั้น ได้นำต้นกลากลูกผสมมากกว่า 2,743 ต้น ไปปลูกลงแปลงในระยะชิด 3x8 เมตร สวนต้นกลากลูกผสมอีก 333 ต้น ได้ทำการทابกึงบนต้นตอทุเรียนพันธุ์ชนิดนี้ที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยได้ดำเนินการระหว่างปี 2531-2534 ที่แปลงทดลองพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยดังกล่าว จังหวัดจันทบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ชลุง จ.จันทบุรี

ต่อมา ได้มีการประเมินและคัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั้วที่ 1 ระหว่างปี 2542-2544

โดยใช้ต้นทุเรียนลูกผสมที่ทางกิงบันตันตอที่ให้ผลผลิตแล้ว และปลูกลงแปลงเริ่มออกดอกติดผลมากขึ้นจำนวน 193 ต้น จาก 19 คู่ผสม ในปี 2542 จำนวน 224 ต้น จาก 20 คู่ผสม ในปี 2543 จำนวน 326 ต้น จาก 21 คู่ผสม ในปี 2544

จึงได้ทำการศึกษาและคัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั้วที่ 1 ดังกล่าว โดยทำการตรวจสอบคุณภาพของผลทุเรียนลูกผสม

เปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อพวงมน้อย 774 ผล ในปี 2542 705 ผล ในปี 2543 1,089 ผล ในปี 2544 ตามลำดับ (ภาพที่ 1, 2)

ทั้งลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน และลักษณะทางการเกษตร จำนวน 26 ลักษณะ แต่เน้นเฉพาะลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญ 5 ลักษณะ คือ น้ำหนักผล ความหวานเนื้อ เปรอร์เช็นต์เนื้อต่อผล คุณภาพในการรับประทาน และเปอร์เซ็นต์เม็ดลูก รวมทั้งอายุการเก็บเกี่ยว

เปอร์เซ็นต์การติดผล และผลผลิต ผลจากการคัดเลือกได้ทุเรียนลูกที่มีคุณภาพดีเด่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 ปี และได้เปรียบเทียบกับพันธุ์ธารค้าในปัจจุบัน ทำให้ได้พันธุ์ทุเรียนลูกผสม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพันธุ์แนะนำต่อไป 3 พันธุ์แรก คือ ทุเรียนลูกผสม ICN x M 5-1-1 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์เมะฉันกับพันธุ์พวงมน้อย ICN 7-5-2-2

เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์เมะฉันกับพอพวงมนี และ 10-251-8 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่กานยา กับพอชานี

ต่อมา ได้ประเมินและคัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั้วที่ 1 ระหว่างปี 2545-2553 ได้พันธุ์ลูกผสมซึ่งมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์อีก 3 พันธุ์ เพื่อเสนอเป็นพันธุ์แนะนำต่อไป

ลักษณะประจำพันธุ์

ลักษณะประจำพันธุ์ ทุ่มใบปรง กิ่งแขนงห่าง เจริญเติบโตดี สูงประมาณ 10 เมตร ในเมืองขนาดใหญ่และใหญ่ รูปทรงยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบเรียวแหลม และยาว (candate-acuminate) ขอบใบเรียบ ความกว้างเฉลี่ย 4.4 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 12.83 เซนติเมตร ดอก/ช่อดอกเกิดตามกิ่งแขนงใหญ่ เป็นช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ประกอบด้วย ดอกอยู่ตั้งแต่ 1-30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มี 5 กลีบ เกสรตัวผู้ติดเป็นแผง (lobe) มี 5 แผง อยู่ตรงข้ามกับกลีบดอก แต่ละ แผงมีก้านชูอับเรณูและอับเรณูอย่างละ 4-18 อัน รังไข่อยู่เหนือส่วนต่าง ๆ ของดอก (superior) มี 5 ห้อง ขนาดรั้งไข่ 0.50-0.70 เซนติเมตร ผลมีลักษณะรูปทรงผลกลมรี น้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 3.15-3.93 กิโลกรัม การผลิต 5.33 เซนติเมตร สีเนื้อเหลืองเข้ม YO14C รสชาติหวานมันมาก เนื้อละเอียด เนื้อขาวปานกลาง กลิ่นปานกลาง เม็ดเยาวราช สีน้ำตาล มีความกว้าง 2.91 เซนติเมตร ยาว 5.94 เซนติเมตร เนื้อหนาเฉลี่ย 1.20 เซนติเมตร รสชาติดี เนื้อแห้ง เส้นใยน้อย เม็ดลูกสีเหลือง ระหว่าง 13.01-47.13 เปอร์เซ็นต์

ข้อพิชที่รับรอง

พื้นที่แนะนำ

เขตปลูกที่เรียนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง หรือภาคอื่น ๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคตะวันออก

ข้อควรระวัง/ข้อจำกัด

ควรระวังโรคระบาดในที่เรียนด้วย

หน่วยงานเจ้าของพันธุ์

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

วันที่รับรอง วัน/เดือน/ปี

14 พ.ย. 2556

ประเภทพันธุ์

พันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น

1. อายุเก็บเกี่ยวสั้นตั้งแต่ 100-109 วัน หลังจากบาน หรือเฉลี่ย 104 วัน (เฉลี่ย 5 ปี)

โดยดอกบานช่วงเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

2. การติดผลอยู่ระหว่าง 1.32-6.45 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ 4 สัปดาห์ หลังจากบาน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ย 5 ปี)

3. มีคุณภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพที่เรียนของประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดยลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์

เป็นต้นได้จากการเมล็ดพันธุ์ก้านยาวที่มีการผสมเกสรแบบเปิด (Open pollination) มีลักษณะรูปทรงผลกลมรี การผลยาว 5.33 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.42 กิโลกรัม ความหนาเปลือก 1.66 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.20 เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลเท่ากับ 25.35 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 28.07 เปอร์เซ็นต์ อายุเก็บเกี่ยวสั้น 104 วัน ซึ่งยางกว่าพันธุ์กระดุมทองรอยละ 8.33

ลักษณะดีเด่นคือสีเนื้อเหลืองเข้ม (YO14C) รสชาติหวานมันมาก เนื้อละเอียด เนื้อขาวปานกลาง กลิ่นปานกลาง